

## Что поможет в диагностике туберкулеза?

В настоящее время для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции в РФ разработан и зарегистрирован новый инновационный препарат Диаскинтест.

Препарат синтезирован с использованием методов генной инженерии. Действие его основано на выявлении клеточного иммунного ответа на специфические для микобактерии туберкулеза (МБТ) антигены.

Диаскинтест (ДСТ) предназначен для постановки внутрикожной пробы, которая проводится по тем же правилам, что и проба Манту с туберкулином. В месте введения препарата развивается аллергическая реакция замедленного типа, характерная для иммунного ответа при туберкулезной инфекции. У отдельных лиц после постановки пробы могут наблюдаться: кратковременное недомогание, головная боль, повышение температуры тела. Никакой опасности в этом нет! Это признаки общей реакции организма, которые могут возникать у любого индивидуума на препараты, содержащие вещества белковой природы

Если при постановке пробы с препаратом Диаскинтест никаких изменений в месте введения не возникает, кроме «уколочной реакции», результат считается отрицательным. В организме ребенка нет активных микобактерий туберкулеза (МБТ)! В случае появления в месте введения препарата покраснения или инфильтрата, внутрикожная проба считается сомнительной или положительной. Чем больше в организме возбудителя, тем больше папула!

Пациенты с сомнительной или положительной реакцией на препарат Диаскинтест в обязательном порядке направляются на консультацию к врачу-фтизиатру для дополнительного обследования с целью раннего выявления туберкулеза и своевременного проведения противотуберкулезных лечебно-профилактических мероприятий.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области №61 от 22.01.12г. туберкулинодиагностика с

использованием Диаскинтеста проводится детям в возрасте с 7 до 14 лет в организованных коллективах.

Массовая туберкулинодиагностика проводится одновременно 2 препаратами:

-туберкулином в стандартном разведении (проба Манту);

-аллергеном туберкулезным рекомбинантным стандартом разведении –

Диаскинтест (ДСТ).

Ведение препаратов осуществляется вакцинаторами учреждений здравоохранения, имеющими справку-допуск.

Оценка результатов туберкулинодиагностики осуществляется вакцинаторами под контролем врача-фтизиатра.